

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Thrombophob[®] 60.000 Gel

Wirkstoff: Heparin-Natrium

Zusammensetzung

100 g Gel enthalten:

- arzneilich wirksamer Bestandteil
60.000 I. E. Heparin-Natrium (Mucosa vom Schwein)
- sonstige Bestandteile
Ammoniak-Lösung 26 %, Carbomer (scheinbare Viskosität 3500-6500 Millipascal-Sekunden), Macro-
gol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph. Eur.), Parfümöl, Polysorbat 60, Propan-2-ol, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 100 g Gel

Zur Verminderung von Schwellungen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Abbott GmbH & Co. KG,

Vertriebslinie Knoll

Max-Planck-Ring 2

65205 Wiesbaden

Tel.: 0 61 22 / 58-0

Fax: 0 61 22 / 58-1244

Anwendungsgebiete

Zur unterstützenden Behandlung bei akuten Schwellungszuständen nach stumpfen Verletzungen (Prellungen/Blutergüssen) und oberflächlicher Venenentzündung, sofern diese nicht durch Kompression behandelt werden kann.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Thrombophob 60.000 Gel nicht anwenden?

Dieses Arzneimittel soll nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Heparin bzw. die Gel-Grundlage.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Bisherige Erfahrungen mit der Anwendung bei Schwangeren und Stillenden haben keine Anhaltspunkte für schädigende Wirkungen ergeben.

Heparin ist nicht plazentagängig und tritt nicht in die Muttermilch über.



Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Thrombophob 60.000 Gel soll nicht auf offene Wunden und/oder nässende Ekzeme aufgebracht werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Thrombophob 60.000 Gel?

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bei örtlicher Anwendung nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Thrombophob 60.000 Gel nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Thrombophob 60.000 Gel sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel von Thrombophob 60.000 Gel und wie oft sollten Sie Thrombophob 60.000 Gel anwenden?

Thrombophob 60.000 Gel soll 2- bis 3-mal täglich dünn und gleichmäßig auf das Erkrankungsgebiet aufgetragen werden.

Wie lange sollten Sie Thrombophob 60.000 Gel anwenden?

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der Arzt. Wenn nicht anders verordnet, sollten Sie Thrombophob 60.000 Gel ca. 1–2 Wochen anwenden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Thrombophob 60.000 Gel auftreten?

Allergische Reaktionen auf Heparin bei Anwendung auf der Haut sind selten. Jedoch können in sehr seltenen Fällen allergische Reaktionen wie Rötung der Haut und Juckreiz auftreten, die nach Absetzen des Präparates in der Regel rasch verschwinden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Thrombophob 60.000 Gel sollte bei Auftreten von allergischen Hautreaktionen abgesetzt werden. Bitte informieren Sie hiervon Ihren Arzt. Darüber hinaus sind keine weiteren besonderen Maßnahmen notwendig.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum ist auf der Tube und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information

November 2004

